

# "濟生"普維酮碘液10%(普維酮-碘)

## POVIDONE-IODINE SOLUTION 10% "CHI SHENG"

衛署藥製字 第 022304 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2022-05-06

### 1 成分

#### 1.1 有效成分及含量

Each ml contain :

有效成份及含量：Povidone-Iodine.....100mg

(Equivalent to available iodine 相當於有效碘10mg)

#### 1.2 其他成分(賦形劑)

Purified water

### 2 用途(適應症)

傷口消毒。

### 3 使用上注意事項

#### 3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏的人

3.1.2 對碘過敏者不能使用

#### 3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 深部皮膚組織感染

#### 3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

#### 3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.4.2 避免陽光直射。

3.4.3 勿超過建議使用量。

3.4.4 塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。

3.4.5 本藥限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四周或黏膜。

3.4.6 本藥勿使用於大面積之體表(以使用者的兩手掌面積為參考)或皮膚深部感染。

3.4.7 使用後請勿覆蓋，以免增加副作用。

3.4.8 本藥有全身性吸收之可能性，因此反覆使用新生兒可能出現甲狀腺功能低下，孕婦及其胎兒及授乳婦有造成甲狀腺腫及甲狀腺功能低下。

3.4.9 會使皮膚或衣物染色。

3.4.10 在首次使用後，本品可在常溫下存放達6個月。(使用後請鎖緊瓶蓋)

### 4 用法用量

以棉球沾之塗於患部。

## 5 警語

5.1 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.1.1 若有任何不適情況發生。

5.1.2 自覺狀況沒有改善或更惡化。

## 6 包裝

4000毫升以下PP塑膠瓶裝

## 7 儲存方式

本藥應避光儲存於25°C以下。

## 8 類別

醫師藥師藥劑生指示藥品

### 製造廠

濟生醫藥生技股份有限公司

新竹縣湖口鄉勝利村實踐路3號

### 藥商

濟生醫藥生技股份有限公司

新竹縣湖口鄉勝利村實踐路3號